arXiv:math/0505340v1 [math.RT] 16 May 2005

Разрешимые алгебры Ли, заданные произведением образующих, и некоторые их приложения

Рутвиг Кампоамор-Штурсберг
Universidad Complutense de Madrid
email: rutwig@ucmail.ucm.es

Аннотация

В настоящей работе мы обобщаем определение произведения образующими на класс разрешимых алгебр Ли. Мы исследуем число инвариантных функций коприсоединенного представления этих алгебр посредством уравнений Маурера-Картана и приводим некоторые приложения к структурам произведения на алгебрах.

1 Введение

Разрешимые алгебры Ли составляют важный класс алгебр не только в связи с многочисленными приложениями к геометрии и механике, но также и для классификации полупрямых сумм алгебр Ли (как известно, полупростой случай классифицирован). В общем случае классификация не была проведена из-за отсутствия общих структур для разрешимых алгебр Ли (таких, как форма Киллинга).
В настоящей работе мы исследуем разрешимые алгебры Ли специального вида, которые мы называем произведениями образующими. Будучи изначально определенной для нильпотентных алгебр, операция произведения образующими может быть определена и в случае разрешимых алгебр Ли. Это приводит к методу построения неразложимых алгебр Ли в больших размерностях.
Мы исследуем также два приложения: инварианты коприсоединенного представления и структуры произведения на группах Ли (мы изучаем алгебры Ли групп Ли).
Мы покажем, что произведения образующими открывают естественный способ изучения структур произведения и паракомплексных структур в произвольной размерности.

2 Произведение образующими разрешимых алгебр Ли

Произведение образующими было изначально введено для нильпотентных алгебр для изучения систем весов. Введенные посредством графа весов, оно может быть охарактеризовано расширениями, что позволяет эффективно работать с уравнениями Маурера-Картана [4]. Эта операция может быть обобщена на случай разрешимых алгебр Ли; в этом случае мы уже теряем наглядную интерпретацию посредством графов. Эта операция позволяет строить неразложимые алгебры Ли.

Как обычно, обозначим через $Z\left(\mathfrak{g}\right)$ центр алгебры Ли $\mathfrak{g}$, а через $b_1(\mathfrak{g})$ — первое число Бетти, то есть размерность пространства $H_1(\mathfrak{g},\mathbb{R})$.

Теорема 1 *Пусть* $\mathfrak{g}_i$ $(i=1,2)$ *— разрешимые алгебры Ли, пусть* $b_1\left(\mathfrak{g}_i\right)=\dim\left(\frac{\mathfrak{g}_i}{[\mathfrak{g}_i,\mathfrak{g}_i]}\right)$. *Тогда существует единственное центральное расширение* $\mathfrak{e}$ *для* $\mathfrak{g}_1\oplus\mathfrak{g}_2$*, удовлетворяющее следующим условиям:*

1. $b_1\left(\mathfrak{e}\right)=b_1\left(\mathfrak{g}_1\right)+b_1\left(\mathfrak{g}_2\right)$
2. $\dim D^1\left(\mathfrak{e}\right)=\dim D^1\left(\mathfrak{g}_1\right)+\dim D^1\left(\mathfrak{g}_2\right)+b_1\left(\mathfrak{g}_1\right)b_1\left(\mathfrak{g}_2\right)$
3. $\dim D^i\left(\mathfrak{e}\right)=\dim D^i\left(\mathfrak{g}_1\right)+\dim D^i\left(\mathfrak{g}_2\right),\ i\geq 2$
4. $\dim\ Z\left(\mathfrak{e}\right)=\dim Z\left(\mathfrak{g}_1\right)+\dim Z\left(\mathfrak{g}_2\right)+b_1\left(\mathfrak{g}_1\right)b_1\left(\mathfrak{g}_2\right).$

Доказательство. Доказательство — формально то же самое, как и в нильпотентном случае [3, 4], при этом убывающая центральная последовательность заменяется на производую последовательность. Фактически расширение определяется посредством коцикла $\varphi\in H^2\left(\mathfrak{g}_1\oplus\mathfrak{g}_2,\mathbb{R}^{b_1(\mathfrak{g}_1)b_2(\mathfrak{g}_2)}\right)$, так что

$$\varphi\left(\mathfrak{g}_1,D^1\mathfrak{g}_2\right)=\varphi\left(D^1\mathfrak{g}_1,\mathfrak{g}_2\right)=0. \tag{1}$$

Условие (1) подразумевает, что

$$\dim_{\mathbb{R}}\left\{\varphi\left(X,X'\right)\ |\ X\in\mathfrak{g}_1-[\mathfrak{g}_1,\mathfrak{g}_1],\ X'\in\mathfrak{g}_2-[\mathfrak{g}_2,\mathfrak{g}_2]\right\}=b_1\left(\mathfrak{g}_1\right)b_1\left(\mathfrak{g}_2\right). \tag{2}$$

Без ограничения общности мы можем считать, что $\left\{X_1,..,X_{b_1(\mathfrak{g}_1)}\right\}$ и $\left\{X'_1,..,X'_{b_1(\mathfrak{g}_2)}\right\}$ — минимальные наборы образующих для $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{g}_2$ соответственно. Если $\left\{e_1,..,e_{b_1(\mathfrak{g}_1)b_1(\mathfrak{g}_2)}\right\}$ — канонический базис в $\mathbb{R}^{b_1(\mathfrak{g}_1)b_2(\mathfrak{g}_2)}$, то мы можем выбрать такого представителя φ, для которого имеет место

$$\varphi\left(X_i,X'_j\right) = e_{(i-1)b_1(g_2)+j},\ 1\leq i\leq b_1\left(\mathfrak{g}_1\right),\ 1\leq j\leq b_1\left(\mathfrak{g}_2\right) \tag{3}$$

$$\varphi\left(X,X'\right) = 0 \text{ при } X\in D^1\mathfrak{g}_1 \text{ или } X'\in D^1\mathfrak{g}_2 \tag{4}$$

Соответствующее расширение удовлетворяет всем требованиям теоремы. ■

Пусть B_i — базис алгебры $\mathfrak{g}_i$ $(i=1,2)$. Тогда скобки Ли в алгебре $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$ представляют собой объединение скобок для алгебр $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{g}_2$ и, кроме того, скобок вида $[X,X']$ для всех образующих $X\in\mathfrak{g}_1$ и $X'\in\mathfrak{g}_2$. В силу уравнения Маурера-Картана, искомое расширение может быть получено добавлением к $b_1(\mathfrak{g}_1)\,b_1(\mathfrak{g}_2)$ 2-формы вида

$$d\eta_{ij}=\omega_i\wedge\omega_j',$$

где ω_i (соотв. ω_i') — форма, соответствующая образующей $X_1\in\mathfrak{g}_1$ (соотв., $X_2\in\mathfrak{g}_2$). Определим теперь произведение образующими следующим образом.

Определение 1 *Произведение образующими* $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$ *представляет собой центральное расширение* $\mathfrak{g}_1\oplus\mathfrak{g}_2$, *определенное классом гомологий* φ.

Предложение 1 *Если* $\mathfrak{g}_i$ *— разрешимая алгебра Ли индекса* j_i *при* $i=1,2$, *то* $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$ *— неразложимая алгебра Ли индекса* $\max\{j_1,j_2\}$. *В частности,* $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2=\mathfrak{g}_2\underline{\times}\mathfrak{g}_1$.

То есть, расширение $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2=\mathfrak{g}_2\underline{\times}\mathfrak{g}_1$ является разрешимой алгеброй Ли.

Определение 2 *Пусть* $\mathfrak{g}$ *— разрешимая алгебра Ли. Алгебра* $\mathfrak{g}$ *называется произведением образующими, если существуют подалгебры* $\mathfrak{g}_1$ *и* $\mathfrak{g}_2$, *такие что* $\mathfrak{g}\simeq\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$.

Предложение 2 *Для любого* $d\geq 4$ *существует разрешимая алгебра Ли* d*-го порядка. Тогда существует пара* $(\mathfrak{g}_1,\mathfrak{g}_2)$ *(здесь* $\mathfrak{g}_i$ *— подалгебра), т.ч.* $\mathfrak{g}\simeq\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$.

Доказательство. Для любого $n\geq 3$ имеем разбиение

$$n=(n-2)+1+1. \tag{5}$$

Пусть $\mathfrak{r}_n$ — алгебра Ли, в которой скобка имеет вид

$$[X_1,X_j]=X_j,\ 2\leq n-2 \tag{6}$$

в базисе $\{X_1,..,X_{n-2}\}$. Алгебра Ли $\mathfrak{r}_n$ — разрешима и не нильпотентна. Далее, $\dim\mathfrak{r}_n/[\mathfrak{r}_n,\mathfrak{r}_n]=1$. Если L_1 — абелева алгебра первого порядка, то произведение $\mathfrak{r}_1\underline{\times}L_1$ представляет собой разрешимую алгебру n-го порядка (за исключением случая $n=3$, так как $\mathfrak{r}_3=L_1$, следовательно $\mathfrak{r}_3\underline{\times}L_1$ изоморфна алгебре Гейзенберга $\mathfrak{h}_1$). ■

Если одна из алгебр $\mathfrak{g}_1$ или $\mathfrak{g}_2$ разрешима, то произведение этих алгебр также разрешима. Имеют место следующие свойства:

Предложение 3 *Пусть* $\mathfrak{g}$ *— произведение образующими. Тогда*

1. $\dim[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \leq \dim\mathfrak{g} - 2$.
2. $\dim Z(\mathfrak{g}) \geq 1$.
3. $\dim\mathfrak{g} \geq 3$.
4. *Если алгебра $\mathfrak{g}$ разрешима и ненильпотентна, то существует разрешимая ненильпотентная подалгебра $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{g}_2$ такая, что $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$.*

Принимая во внимание перечисленные выше структурные результаты о произведениях образующими, мы можем получить полную классификацию таких алгебр, опираясь на уже известную классификацию в низших размерностях. Приведем классификаицию в размерности семь с точностью до изоморфизма.

Предложение 4 *Пусть $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$ — произведение образующими, и пусть $(d_i, m_i) = (\dim\mathfrak{g}_i, b_1(\mathfrak{g}_i))$ при $i = 1, 2$. Если $\dim\mathfrak{g} = 7$, то имеет место один из следующих случаев:*

1. $(d_1, m_1) = (5, 1)$, $(d_2, m_2) = (1, 1)$.
2. $(d_1, m_1) = (4, 1)$, $(d_2, m_2) = (2, 1)$.
3. $(d_1, m_1) = (3, 1)$, $(d_2, m_2) = (3, 1)$.
4. $(d_1, m_1) = (4, 2)$, $(d_2, m_2) = (1, 1)$.
5. $(d_1, m_1) = (3, 2)$, $(d_2, m_2) = (2, 1)$.
6. $(d_1, m_1) = (3, 1)$, $(d_2, m_2) = (2, 2)$
7. $(d_1, m_1) = (3, 3)$, $(d_2, m_2) = (1, 1)$.

В частности, если $b_1(\mathfrak{g}) = 4$, то алгебра $\mathfrak{g}$ является нильпотентной.

Доказательство. Так как $\dim(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2) = d_1 + d_2 + m_1 m_2$, дальнейшая классификация сводится к разбиению числа семь в сумму трех натруальных чисел. Учитывая $b_1(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2) = b_1(\mathfrak{g}_1) + b_1(\mathfrak{g}_2) = m_1 + m_2$ и $\dim\mathfrak{g} = 7$, мы имеем $2 \leq b_1(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2) \leq 4$. Если $b_1(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2) = 2$, to $m_1 = m_2 = 1$, и мы приходим к случаям 1.-3. Если $b_1(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2) = 3$, мы имеем

$$7 = d_1 + d_2 + 2.$$

Если $d_1 = 4$, то $d_2 = 1$, следовательно $m_2 = 1$, $m_2 = 2$. Мы приходим к случаю 4. Если $d_1 = 3$ и $d_2 = 2$, то либо $m_1 = 1$ и $m_2 = 2$, либо $m_1 = 2$ и $m_2 = 1$. Это приводит нас к случаям 5 и 6. Если $b_1(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2) = 4$, то $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{g}_2$ — абелевы алгебры, и произведение $\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$ нильпотентно. ■

Для порядков $n \geq 8$ мы можем решать эту задачу, но так как разрешимые алгберы Ли размерностей $n \geq 7$ не классифицированы (последняя известная размерность — шесть [5, 6]), результат не был бы окончательным.

3 Применение к инвариантам

Инварианты коприсоединенного представления играют важную роль в теории представлений, а также во многих геометрических и физических приложениях (квантовые числа и ограничения представлений для моделей в ядерной и атомной физике).

Одним из стандартных методов для определения этих инвариантов является теория дифференциальных уравнений; она позволяет получать не только полиномиальные инварианты (связанные с операторами Казимира), но также и иррациональные функции, которые находят применение в теории интегрируемых гамильтоновых систем [7, 8, 9]. Пусть $\left\{C_{ij}^{k}\right\}$ — структурный тензор алгебры Ли $\mathfrak{g}$ в базисе $\{X_1,..,X_n\}$. Пусть

$$\widehat{X}_i=-C_{ij}^{k}x_k\partial_{x_j} \tag{7}$$

— представление алгебры Ли, где $[X_i,X_j]=C_{ij}^{k}X_k$ $(1\leq i<j\leq n,\ 1\leq k\leq n)$. Аналитическая функция $F\left(X_1,..,X_n\right)$ на $\mathfrak{g}^*$ является инвариантом коприсоединенного представления алгебры Ли $\mathfrak{g}$ тогда и только тогда, когда

$$\widehat{X}_iF\left(x_1,..,x_n\right)=-C_{ij}^{k}x_k\partial_{x_j}F\left(x_1,..,x_n\right)=0,\ 1\leq i\leq n. \tag{8}$$

Общее число $\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\right)$ решений (как полиномиальных, так и неполиномиальных) системы (8) задается формулой

$$\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\right)=\dim\,\mathfrak{g}-\operatorname{rank}\,\left(C_{ij}^{k}x_k\right), \tag{9}$$

где матрица $A(\mathfrak{g})$ выражается по формуле:

$$A(\mathfrak{g})=\left(C_{ij}^{k}x_k\right), \tag{10}$$

в базисе $\{X_1,..,X_n\}$. Эту формулу можно также интерпретировать с использованием уравнения Маурера-Картана следующим образом. Пусть $\mathcal{L}(\mathfrak{g})=\mathbb{R}\left\{d\omega_i\right\}_{1\leq i\leq\dim\mathfrak{g}}$ — подпространство пространства $\bigwedge^2\mathfrak{g}^*$, порожденное 2-формами $d\omega_i$. Так как $\dim\mathcal{L}(\mathfrak{g})=\dim\left(\mathfrak{g}\right)$ тогда и только тогда, когда $d\omega_i\neq 0$ при всех i, то есть $\mathfrak{g}=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$, если $\omega=a^id\omega_i$ — элемент общего положения в $\mathcal{L}(\mathfrak{g})$, тогда существует $j_0\left(\omega\right)\in\mathbb{N}$, т.ч.

$$\bigwedge^{j_0(\omega)}\omega\neq 0,\qquad\bigwedge^{j_0(\omega)+1}\omega\equiv 0. \tag{11}$$

Тогда $r\left(\omega\right)=2j_0\left(\omega\right)$, где $r\left(\omega\right)$ — ранг 2-формы ω [10]. Положим

$$j_0\left(\mathfrak{g}\right)=\max\left\{j_0\left(\omega\right)\ |\ \omega\in\mathcal{L}(\mathfrak{g})\right\}. \tag{12}$$

Очевидно, что $j_0\left(\mathfrak{g}\right)$ — числовой инвариант алгебры Ли $\mathfrak{g}$. Короткое вычисление показывает, что

$$\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\right)=\dim\mathfrak{g}-2j_0\left(\mathfrak{g}\right). \tag{13}$$

Формула (13) важна для оценки числа инвариантов полупрямых произведений в том случае, когда общий метод уже не работает.

Для определения числа независимых инвариантов применим формулу (13), учитывая уравнения Маурера-Картана. Пусть $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{g}_2$ — разрешимые алгебры Ли и пусть $\left\{C_{ij}^k\right\}$ (соответстсвенно $\left\{\overline{C}_{lm}^n\right\}$) — структурный тензор алгебры $\mathfrak{g}_i$ $(i = 1, 2)$ в базисе $\{X_1, .., X_{d_1}\}$, соотв. $\left\{X'_1, .., X'_{d_2}\right\}$. Уравнения Маурера-Картана имеют вид:

$$\begin{aligned} d\omega_i &= 0,\ 1 < i < m_1 &\quad (14)\\ d\omega_k &= -C_{ij}^k \omega_i \wedge \omega_j,\ k \geq m_1, &\quad (15)\end{aligned}$$

для $\mathfrak{g}_1$, при этом

$$\begin{aligned} d\omega'_i &= 0,\ 1 < i < m_2 &\quad (16)\\ d\omega'_k &= -\overline{C}_{ij}^k \omega'_i \wedge \omega'_j,\ k \geq m_2. &\quad (17)\end{aligned}$$

для $\mathfrak{g}_2$. Тогда уравнения для произведений $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$ имеют вид (15)-(18) i

$$d\eta_{ij} = \omega_i \wedge \omega'_j, \quad 1 \leq i \leq m_1, 1 \leq j \leq m_2. \tag{18}$$

Для всех X_i (соответственно для X'_i)

$$X_i \lrcorner\, \omega_j = \delta_{ij} \text{ (соотв. } X'_i \lrcorner\, \omega'_j), \tag{19}$$

где $\lrcorner$ — внутренне произведение. Число $\mathcal{N}(\mathfrak{g})$ можно получить из максимального ранга элементов общего положения, задаваемого формулами (15)-(19). Приводимый ниже результат задает метод нахождения этого числа.

Предложение 5 *Пусть* $\omega_0 \in \mathcal{L}(\mathfrak{g}_1)$, *и пусть* $\omega'_0 \in \mathcal{L}(\mathfrak{g}_2)$ *— две формы, т.ч.* $j_0(\omega_0) = j_0(\mathfrak{g}_1)$ *и* $j_0(\omega'_0) = j_0(\mathfrak{g}_2)$. *Пусть* $F \subset \{1, .., m_1\}$ *и* $F' \subset \{1, .., m_2\}$ *— подмножества, т.ч.*

1. $\forall \alpha \in F \Rightarrow X_\alpha \lrcorner\, \omega_0 \equiv 0.$
2. $\forall \beta \in F' \Rightarrow X'_\beta \lrcorner\, \omega'_0 \equiv 0.$

Тогда

$$j_0(\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2) = j_0(\mathfrak{g}_1) + j_0(\mathfrak{g}_2) + j_0(\omega), \tag{20}$$

где

$$\omega = \sum_{\alpha \in F, \beta \in F'} \omega_\alpha \wedge \omega_\beta. \tag{21}$$

В частности,

$$m_1 m_2 \leq \mathcal{N}(\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2) \leq \mathcal{N}(\mathfrak{g}_1) + \mathcal{N}(\mathfrak{g}_2) + (m_1 m_2 - 2 j_0(\omega)). \tag{22}$$

Доказательство. Уравнния Маурера-Картана $\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$ получаются из уравнений (15)-(18). Число независимых инвариантов выписывается по формуле

$$\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2\right) = \dim\left(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2\right) - 2j_0\left(\theta\right), \tag{23}$$

где $\theta \in \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2\right)$ — общая форма максимального ранга. Пусть $\alpha \in F$. Так как $\omega_0 \in \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}_1\right)$, уравнение $X_\alpha \lrcorner \omega_0 = 0$ подразумевает, что $[X, X_\alpha] = \psi^k X_k \neq 0$ для всех $X \in \mathfrak{g}_1$ (то есть, $d\omega_k$ не лежит в ω_0). Легко видеть, что

$$\omega_0 + \omega_0' + \sum_{\alpha \in F, \beta \in F'} \omega_\alpha \wedge \omega_\beta \tag{24}$$

имеет максималный ранг, так как $j_0\left(\omega_0\right) = j_0\left(\mathfrak{g}_1\right)$, $j_0\left(\omega_0'\right) = j_0\left(\mathfrak{g}_2\right)$ и $\omega \notin \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}_1\right) + \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}_2\right)$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2\right) &= \dim \mathfrak{g}_1 + \dim \mathfrak{g}_2 + m_1 m_2 - 2\left(j_0\left(\omega_0\right) + j_0\left(\omega_0'\right) + j_0\left(\omega\right)\right) \\ &= \mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1\right) + \mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_2\right) + \left(m_1 m_2 - 2j_0\left(\omega\right)\right). \end{aligned} \tag{25}$$

$m_1 m_2 \leq \mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2\right)$ следует из того факта, что добавленные элементы являются центральными. ■

Следствие 1 *Если $\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1\right) = \mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_2\right) = 0$, то $\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2\right) = m_1 m_2$.*

Доказательство. В этом случае $\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_1\right) = \mathcal{N}\left(\mathfrak{g}_2\right) = 0$, существуют 2-формы $\omega_0 \in \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}_1\right)$ и $\omega_0' \in \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}_2\right)$, т.ч. $\dim \mathfrak{g}_1 = 2j_0\left(\omega_0\right)$ и $\dim \mathfrak{g}_2 = 2j_0\left(\omega_0'\right)$. То есть, форма $\theta = \omega_0 + \omega_0'$ имеет ранг $\dim \mathfrak{g}_1 + \dim \mathfrak{g}_2$. Алгебра $\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$ содержит в точности $m_1 m_2$ центральных элементов. Таким образом, форма θ имеет максимальный ранг. ■

Замечание 1 *Обратное, вообще говоря, неверно. Пусть $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли, задаваемая уравнениями*

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= \omega_2 \wedge \omega_3 + \omega_1 \wedge \omega_4 \\ d\omega_2 &= \omega_2 \wedge \omega_4 - \omega_2 \wedge \omega_5 \\ d\omega_3 &= \omega_3 \wedge \omega_5 \\ d\omega_4 &= d\omega_5 = 0 \end{aligned}$$

Форма $\omega_0 = d\omega_1$ удовлетворяет уравнению $j_0\left(\omega_0\right) = j_0\left(\mathfrak{g}\right) = 2$, то есть $\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\right) = 1$. Тогда $\mathfrak{g} \underline{\times} \mathfrak{g}$ — разрешимая алгебра Ли 14-го порядка (так как $b_1\left(\mathfrak{g}\right) = 2$), при этом уравнения Маурера-Картана имеют вид

$$\begin{array}{lll} d\omega_1 = \omega_2 \wedge \omega_3 + \omega_1 \wedge \omega_4; & d\omega_1' = \omega_2' \wedge \omega_3' + \omega_1' \wedge \omega_4'; & d\eta_1 = \omega_4 \wedge \omega_4' \\ d\omega_2 = \omega_2 \wedge \omega_4 - \omega_2 \wedge \omega_5; & d\omega_2' = \omega_2' \wedge \omega_4' - \omega_2' \wedge \omega_5'; & d\eta_2 = \omega_4 \wedge \omega_5' \\ d\omega_3 = \omega_3 \wedge \omega_5; & d\omega_3' = \omega_3' \wedge \omega_5'; & d\eta_3 = \omega_5 \wedge \omega_4' \\ d\omega_4 = d\omega_5 = 0; & d\omega_4' = d\omega_5' = 0; & d\eta_4 = \omega_5 \wedge \omega_5' \end{array}$$

в базисе $\{\omega_1,..,\omega_5,\omega'_1,..,\omega'_5,\eta_1,..,\eta_4\}$*. Пусть* $\theta = \alpha^i d\omega_i + \beta^j d\omega'_j + \gamma^k d\eta_k \in \mathcal{L}\left(\mathfrak{g}\underline{\times}\mathfrak{g}\right)$ *— элемент общего положения. Тогда* $\bigwedge^6 \theta \equiv 0$ *и*

$$\bigwedge^5 \theta = \left(\alpha^1\right)^2 \left(\beta^1\right)^2 \gamma^4 \omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \omega_4 \wedge \omega_5 \wedge \omega'_1 \wedge \omega'_2 \wedge \omega'_3 \wedge \omega'_4 \wedge \omega'_5 \neq 0$$

тогда и только тогда, кода $\alpha^1\beta^1\gamma^4 \neq 0$*. Форма* $\theta' = d\omega_1 + d\omega'_1 + d\eta_4$ *имеет максимальный ранг, при этом* $\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\underline{\times}\mathfrak{g}\right) = 4$*. В частности, мы получаем, что если* F *и* F' *не пусты, то этом* $\omega = d\eta_4$ *удовлетворяет условию* $j_0\left(\omega\right) = 1$*, тогда* $2\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\right) - 2j_0\left(\omega\right) = 0$*. Кроме того, алгебра* $\mathfrak{g}\underline{\times}\mathfrak{g}$ *имеет четыре оператора Казимира, в то же время* $\mathfrak{g}$ *не имеет полиномиальных инвариантов (но лишь рациональные инварианты).*

4 Приложения к структурам произведений

Приведем теперь некоторые приложения к дифференциально-геометрическим структурам на группах Ли. Эти конструкции позволяют получать некоторые новые алгебры Ли в произвольных размерностях, которые образуют новые классы, пополняющие известные случаи.

Определение 3 *Пусть* $E : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$*,* $E \neq \pm id$ *— инволютивный автоморфизм алгебры* $\mathfrak{g}$*. В этом случае автоморфизм* E *задает структуру почти произведения. Говорят, что* E *задает структуру произведения, если имеет место интегрируемость, т.е. если для любых* $X, Y \in \mathfrak{g}$ *имеют место следующие тождества.*

$$E\left[X,Y\right] = \left[E\left(X\right),Y\right] + \left[X,E\left(Y\right)\right] - E\left[E\left(X\right),E\left(Y\right)\right].$$

Мы имеем разложение

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_-, \qquad (26)$$

где $\mathfrak{g}_+$ — собственное подпространство, соответствующее собственному значению $\lambda = 1$, а $\mathfrak{g}_-$ — собственное пространство, соответствующее собственному значению $\lambda = -1$. Если условие интегрируемости выполняется, то подпространства $\mathfrak{g}_+$ и $\mathfrak{g}_-$ являются подалгебрами. Такие структуры были изучены для различных типов алгебр Ли и классифицированы для алгебр Ли размерностей $n \leq 4$ [11]. В настоящем разделе мы показываем, что произведения образующими дают новые нетривиальным примеры алгебр Ли, обладающие такой структурой; эти алгебры определяются в терминах своих подалгебр.

Предложение 6 *Пусть* $\mathfrak{g}_i$ $(i = 1,2)$ *— разрешимые алгебры Ли, и пусть* E_i $(i = 1,2)$ *— структура произведения для* $i = 1,2$*. Пусть* $E_1\left(X_j\right) = \varepsilon_j X_j$ *при* $1 \leq j \leq n$*,* $\varepsilon_j = \pm 1$ *в базисе* $\{X_1,..,X_n\}$ *(соотв.* $E_2\left(X'_j\right) = \varepsilon_j X'_j$ *при* $1 \leq j \leq m$*,* $\varepsilon_j = \pm 1$ *в базисе* $\{X'_1,..,X'_n\}$*). Тогда* $\mathfrak{g}_1\underline{\times}\mathfrak{g}_2$ *является структурным произведением.*

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $X_i\,(1 \le i \le b_1\,(\mathfrak{g}_1) \le n)$, т.ч. $X_i \notin [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_1]$ (по аналогии со случаем $\mathfrak{g}_2$). Пусть $\left[X_i, X_j'\right] = Z_{ij}$ при $1 \le i \le b_1(\mathfrak{g}_1), 1 \le j \le b_1\,(\mathfrak{g}_2)$ и $E : \mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2 \to \mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$ by $E|_{\mathfrak{g}_1} = E_1$ — векторное отображение, т.ч. $E|_{\mathfrak{g}_1} = E_1$ и пусть $E|_{\mathfrak{g}_2} = E_2$. Кроме того, действие E на новых элементах Z_{ij} — диагонально. Так как E_1 и E_2 интегрируемы, при этом $[\mathfrak{g}_1, D^1\mathfrak{g}_2] = [D^1\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2] = 0$, нам достаточно проверить условие интегрируемости лишь на парах $(X, X') \in \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ с $[X, X'] \ne 0$: Пусть $X = \alpha^i X_i + \beta^j Y_j$ $(i \le n)$ и $X' = \gamma^k X_k' + \delta^l Y_l'$, где $Y_i \in [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_1]$ соответственно $Y_i' \in [\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2]$. Тогда

$$\begin{aligned}
& E\,[X, X'] - [E\,(X)\,, X'] - [X, E\,(X')] + E\,[E\,(X)\,, E\,(X')] \\
= \; & \alpha^i \gamma^k E\,(Z_{ik}) - \alpha^i \gamma^k\,(\varepsilon_i + \varepsilon_k)\,Z_{ik} + \alpha^i \gamma^k \varepsilon_i \varepsilon_k E\,(Z_{ik}) \\
= \; & \alpha^i \gamma^k \left\{(1 + \varepsilon_i \varepsilon_k)\,E\,(Z_{ik}) - (\varepsilon_i + \varepsilon_k)\,Z_{ik}\right\}. \qquad (27)
\end{aligned}$$

Чтобы уравнение (28) обратилось в ноль, для всех пар (i, k) нам нужно $E\,(Z_{ik}) = \lambda_{ik} Z_{ik}$ s $\lambda_{ik} = \pm 1$. Имеют место два различных случая:

1. При (i_0, k_0) мы имеем $\varepsilon_{i_0} + \varepsilon_{k_0} = 0$. Тогда $1 + \varepsilon_{i_0}\varepsilon_{k_0} = 0$, и мы можем положить $\lambda_{i_0 k_0}$ равным 1 или -1.
2. При (i_0, k_0) имеем $\varepsilon_{i_0} + \varepsilon_{k_0} \ne 0$. Тогда $sgn\,(\varepsilon_{i_0}) = sgn\,(\varepsilon_{k_0})$; таким образом, $2E\,(Z_{i_0 k_0}) = \pm 2 Z_{i_0 k_0}$, поэтому $\lambda_{i_0 k_0} = \pm 1$; знак выбирается в зависимости от $\varepsilon_{i_0} + \varepsilon_{k_0}$.

Действие E на Z_{ij} полностью определено в случае $(\varepsilon_i + \varepsilon_k) \ne 0$. В остальных случаях мы можем выбрать знак для λ_{ij}. Для разложения (26) мы имеем

$$\mathfrak{g}_+^E = \mathfrak{g}_+^{E_1} \oplus \mathfrak{g}_+^{E_2} \oplus \langle Z_{ij} \mid \lambda_{ij} = 1 \rangle \qquad (28)$$

$$\mathfrak{g}_-^E = \mathfrak{g}_-^{E_1} \oplus \mathfrak{g}_-^{E_2} \oplus \langle Z_{ij} \mid \lambda_{ij} = -1 \rangle \qquad (29)$$

Так как E_1 и E_2 интегрируемы, то $\mathfrak{g}_+^E$ и $\mathfrak{g}_-^E$ являются подалгебрами в $\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$. $\blacksquare$

Пример 1 *Рассмотрим теперь следующие алгебры Ли* $\mathfrak{r}_4$ *и* $\mathfrak{r}_{4,0}$*:*

$$\mathfrak{r}_4 : \; [X_0, X_1] = X_1, \; [X_0 X_2] = X_1 + X_2, \; [X_0, X_3] = X_2 + X_3 \qquad (30)$$

в базисе $\{X_0, X_1, X_2, X_3\}$ *и*

$$\mathfrak{r}_{4,0} : \; [X_4, X_5] = X_6, \; [X_4, X_7] = X_6 \qquad (31)$$

в базисе $\{X_4, X_5, X_6, X_7\}$*. Пусть произведение* $\mathfrak{r}_4 \underline{\times} \mathfrak{r}_{4,0}$*. В базисе* $\{X_0, .., X_9\}$ *алгебра задается скобками*

$$[X_0, X_4] = X_8, \; [X_0, X_7] = X_9. \qquad (32)$$

и коммутационными соотношениями (31)-(32). Алгебры $\mathfrak{r}_4$ *и* $\mathfrak{r}_{4,0}$ *имеют структуру* E_1*, соотв.* E_2*, где*

$$\begin{aligned} E_1(X_i) &= X_i,\ i=0,1;\ E_1(X_i)=-X_i,\ i=2,3 && (33)\\ E_2(X_i) &= X_i,\ i=4,5;\ E_2(X_i)=-X_i,\ i=6,7. && (34)\end{aligned}$$

Теперь определим $E:\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0}\to\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0}$ *таким образом, что* $E|_{\mathfrak{r}_4}=E_1,\ E|_{\mathfrak{r}_{4,0}}=E_2$*. Из предложения 6 следует, что*

$$E(X_8)=X_8,\ E(X_9)=\lambda X_9, \qquad (35)$$

где $\lambda=\pm1$*. Если* $\lambda=1$*, то мы получим структуру на* $\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0}$*, т.ч.* $\dim(\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0})_+=6,\ \dim(\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0})_-=4$*, в то время как выбор* $\lambda=-1$ *задает структуру с* $\dim(\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0})_+=\dim(\mathfrak{r}_4\underline{\times}\mathfrak{r}_{4,0})_-=5$.

Определение 4 *Пусть* $\mathfrak{g}$ *— алгебра Ли со структурой произведения* E*. Если* $\dim\mathfrak{g}_+=\dim\mathfrak{g}_-$*, то* E *называют паракомплексной структурой на* $\mathfrak{g}$.

Следствие 2 *Пусть* $\mathfrak{g}$ *— разрешимая алгебра Ли, для которой* $\{X_1,..,X_{4m},..,X_{2n}\}$*, так что* $b_1(\mathfrak{g})=4m$*, и пусть* E *— паракомплексная структура. Если*

1. $X_i\notin D^1\mathfrak{g}$ *при* $1\le i\le 4m$,
2. $X_i\in\mathfrak{g}_+$ *при* $1\le i\le 2m$ *and* $X_i\in\mathfrak{g}_-$ *for* $2m+1\le i\le 4m$.
3. $b_1(\mathfrak{g}_+)=b_1(\mathfrak{g}_-)=2m$.

то $\mathfrak{g}_+\underline{\times}\mathfrak{g}_-$ *допускает паракомплексную структуру.*

Доказательство. Так как E — паракомплексная структура, то размерность $\dim\mathfrak{g}_+\underline{\times}\mathfrak{g}_-$ четна. Предложение 6 задает структуру произведения E на $\mathfrak{g}_+\underline{\times}\mathfrak{g}_-$. Ограничение на $\mathfrak{g}_+$ и $\mathfrak{g}_-$ является тождественным(соотв., антитождественным) отображением. Условием 2 (см. доказательство предложения 6) знак $E([X_i,X_j])$ $(1\le i\le 2m, 2m+1\le j\le 4m)$ определен быть не может. Из $4m^2$ элементов вида $[X_i,X_j]$ сопоставим $2m^2$ элементам знак плюс, а остальным $2m^2$ элементам — знак минус. Поэтому $\dim(\mathfrak{g}_+\underline{\times}\mathfrak{g}_{-.})_+=\dim(\mathfrak{g}_+\underline{\times}\mathfrak{g}_{-.})_-=n+2m^2$. ■

Предыдущий пример показывает, что условие является достаточным, но не необходимым для существования комплексных структур на произведениях.

Автор выражает благодарность А.В.Чернавскому за приглашение на конференцию и В.О.Мантурову за ценные обсуждения и помощь.

Список литературы

[1] J. M. Ancochea and R. Campoamor-Stursberg. Two step solvable Lie algebras and weight graphs, Tranf. Groups **7** (2002), 307-320.

[2] J. M. Ancochea and R. Campoamor-Stursberg. Characteristically nilpotent Lie algebras of type $\mathfrak{g}_1 \underline{\times} \mathfrak{g}_2$, Forum Math. **15** (2003), 299-307.

[3] R. Campoamor-Stursberg. A graph theoretical determination of solvable complete rigid Lie algebras, Linear Alg. Appl. **372** (2003), 53-66.

[4] J. M. Ancochea and R. Campoamor-Stursberg. Symplectic forms and products by generators, Comm. Algebra **30** (2002), 4235-4249.

[5] Г.М.Мубаракзянов, О разрешимых алгебрах Ли, Известия ВУЗов. Математика. **32** (1963), 114-123.

[6] P. Turkowski. Solvable Lie algebras of dimension six. J. Math. Phys. **31** (1990), 1344-1350.

[7] А.Л. Переломов. Интегрируемые системы классической механики и алгебры Ли, РХД., Москва, 2002.

[8] Д.В. Берзин, Инварианты коприсоединенного представления для алгебр Ли некоторого специального вида, УМН **51** (1996), 141-143.

[9] В.В.Трофимов. Введение в геометрию многообразий с симметриями, изд. МГУ, 1989.

[10] R. Campoamor-Stursberg. An alternative interpretation of the Beltrametti-Blasi formula by means of differential forms, Phys. Lett. A **327** (2004), 138-145.

[11] A. Andrada, M.L. Barberis, I. Dotti, G. Ovando. Product structures on four dimensional solvable Lie algebras, available at xxx.lanl.gov/math.RA/0402234.